

一、若有下列情況應當告知醫師或藥師：

- (一) 對藥物、食物或特殊物質有過敏反應或異常反應。
- (二) 懷孕、打算懷孕，或有可能懷孕。
- (三) 在過去數週內曾服用其他藥物。
- (四) 有家族遺傳疾病或其他疾病。

二、服藥前的注意事項：

- (一) 按時服藥，千萬不要延遲服藥，以免延誤病情康復的時間。
- (二) 遵照醫師或藥師的指示，於正確時間即正確時間內服藥。
- (三) 服藥前最好再次閱讀標示，並注意藥物是否超過有效期限。
- (四) 同時有中西藥物必須服用時，一定要間隔一小時以上，切勿同時服用 兩劑量的藥，避免藥物過量。
- (五) 任何藥物都可能會有副作用或不良反應！應主動詢問及瞭解有哪些副作用需特別注意及該如何處理。

三、服用藥物的注意事項

- (一) 不論中西藥物，服用時請佩服溫開水，不宜喝茶、咖啡、可樂或果汁等。
- (二) 服用藥物不宜擅自停藥、刪減劑量或改變吃法；若出現任何不適之副作用時必須告知醫師，由醫師評估是否換藥或增減劑量。
- (三) 即使有相同的症狀，也不要服用他人的藥物或將自己的藥物給他人服用。
- (四) 進行手術（包括拔牙）前，或緊急醫療情況下，應先告知醫師你目前正在服用藥物。
- (五) 服藥後若有任何異常反應發生，應儘速與醫師或藥師聯絡。

、避免服錯藥物

- (一) 服藥前應仔細閱讀標示，若標示不清楚或不明確，應請教醫師或藥師。
- (二) 服藥期間不可將貼在容器上面的標示撕掉，以避免混淆。
- (三) 避免取藥錯誤，切忌在黑暗中摸索服用藥物。
- (四) 服用藥物後如有不適應感，請加以記錄下來，或回診給醫師看診。
- (五) 手邊最好有醫院或急救中心的電話，以備不時之需。

如有任何問題，請聯絡我們，電話 04-24922000-1110