

血液透析室

腎臟替代療法的選擇

制訂日期:98年4月20日

修訂日期:113年3月8日

	腹膜透析	血液透析	腎臟移植
治療方式	<ul style="list-style-type: none">在腹部開刀植入導管經導管注入透析液，留置腹腔中清除毒素每日執行4-5次換液，或由機器在睡眠中執行透析（APD）在居家或工作場所或任何地方都可自行操作換液每個月回醫院1-2次	<ul style="list-style-type: none">在手臂開刀做透析瘻管在透析瘻管上扎入兩針，經由機器清除毒素每星期到醫院3次，每次透析時間為4~5小時需在醫院血液透析室，由醫護人員執行透析	<ul style="list-style-type: none">由腹部開刀，不摘除原有腎臟，將移植腎臟放於下腹部腎臟移植後，需長期服用抗排斥藥物
優點	<ul style="list-style-type: none">學習容易，可以在家自行透析不需扎針，不與他人共用設備，減少血液感染風險生活形態較彈性，有較佳生活品質	<ul style="list-style-type: none">有效快速清除廢物及水份由醫療人員於透析中心執行一星期三次透析，與他人及醫護人員互動較頻繁	<ul style="list-style-type: none">不需定期透析，可有效改善身體健康飲食限制較少有較佳的生活品質
缺點	<ul style="list-style-type: none">有可能感染腹膜炎：主要是換液操作不當，正確換液是有效預防方法血中脂質增加蛋白質流失	<ul style="list-style-type: none">需配合醫療院所透析時間表每次治療都需扎針短時間內移除毒素及水分，透析中可能引起不適	<ul style="list-style-type: none">腎臟來源有限手術有其風險性需終身長期服用抗排斥藥物抗排斥藥物易使免疫功能下降，較容易感染

安寧療護

將考量年齡、日常功能狀況、本身疾病狀況因素（例如：癌末、長期使用呼吸器或器官衰竭）、或繼續透析已無法改善生活品質時，不洗腎（或終止洗腎）的內科治療、或依需要洗腎、或規律但減少洗腎頻率（如每週2次或1次）緩解症狀的方式接受安寧緩和療護，也是一種選擇。

◎諮詢方法

若對以上內容有疑問或建議, 請洽詢(04)24922000 轉分機 1601、1602 或 E-mail

至 wfcc.hos@msa.hinet.net

霧峰澄清醫院 關心您!!