

血液透析室

認識新興傳染病-猴痘

制訂日期:112年4月27日

一、認識猴痘病毒

猴痘是由猴痘病毒引起的疾病，屬於人畜共通傳染病，與天花屬於同一病毒家族，症狀相似但嚴重度較輕，而且猴痘很少致命。病毒會透過染疫的野生動物(如：狐猴、猿猴、老鼠、松鼠等靈長類或齧齒類動物等)傳染給人。

二、猴痘病毒傳播方式與潛伏期

1、人傳人：

①接觸感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚、黏膜或被汙染物品。猴痘可以透過密切接觸而傳播，例如經由親密接觸之性行為，或接觸猴痘患者生殖器(陰莖、睪丸、陰唇及陰道)或肛門、與猴痘患者進行擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸等。□

②飛沫傳播需在長時間面對面接觸下較容易發生，因此未著適當個人防護之醫護人員及同住家人有較大的感染風險。□

③產婦可經胎盤垂直傳染給胎兒，或於產程中因接觸而傳染。□

2、人畜共通傳染：直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染。食用受感染的動物肉類。□

3、染疫後潛伏期約介於3至21天。

三、感染猴痘病毒的症狀

1、猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。□

2、常見症狀為發燒、畏寒、頭痛、肌肉痠痛、淋巴腺腫大等症狀，發燒1-3天後會出現不同型態的皮膚病灶(如:皮疹、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等)，部分亦出現在生殖器

上。□

3、與水痘最大的差別是有淋巴結腫大的症狀，而且在兒童或免疫低下者尤其容易導致重症。

四、治療照護

大多數病人不需特殊治療，必要時可提供輸液治療與維持營養等支持性療法，以減輕症狀和併發症。目前有數種藥物可用於治療，我國猴痘抗病毒藥物使用對象有猴痘重症患者、嚴重免疫不全者、兒童族群（特別是1歲以下嬰兒）、孕婦及哺乳婦女。

五、猴痘的預防方式

1、降低人畜共通傳播風險：

①前往猴痘病毒流行地區時，避免接觸齧齒動物和靈長類動物以及生病或死亡動物。

②所有食物必須徹底煮熟後才能食用。

③保持良好手部衛生。

2、降低人際間傳播風險：

①猴痘主要透過密切接觸而傳播，應避免與猴痘患者進行皮膚直接接觸、親吻、擁抱及性行為。

②保持良好手部衛生。

③如有症狀，應佩戴口罩立刻就醫，並告知旅遊史與接觸史。

六、諮詢方法

若對以上內容有疑問或建議，請洽詢(04)24922000 轉分機 1601、1602 或 E-mail 至 wfcc.hos@msa.hinet.net

霧峰澄清醫院 關心您!!

參考資料：衛生福利部疾病管署